

COVID-19 y RCP Básica



Luis Uribe. Pediatra

Vitoria, 2 y 5 de Octubre 2020

Colabora:
Ramón Ugarte

ALGUNOS CONCEPTOS

- ✓ Asistolia - Fibrilación Ventricular
- ✓ Esternón - Apéndice xifoides



RCP Básica - TÉCNICAS

Normalidad


- ✓ Apertura vía aérea
- ✓ Posición lateral de seguridad
- ✓ Boca a boca
- ? Detección de pulso
- ✓ Compresiones torácicas
- ✓ Desfibrilador

Era Covid-19

- ✗ Apertura vía aérea
- ✓ Posición lateral de seguridad
- ✗ Boca a boca
- ? Detección de pulso
- ✓ Compresiones torácicas
- ✓ Desfibrilador

Apertura de la Vía Aérea (Frente-Mentón)

ERA COVID-19



Comprobar Respiración



Posición Lateral de Seguridad

ERA COVID-19



Respiración Boca-Boca

ERA COVID-19



Detección de Pulso

ERA COVID-19

?



Compresiones (Masaje Cardíaco)

ERA COVID-19




Desfibrilación

ERA COVID-19



RCP Básica en Adultos, Niños y Lactantes.

Prioridades ERA COVID-19



Cadena de Supervivencia



RCP Básica en Adultos



RCP Básica en Adultos

ERA COVID-19



RCP Básica en Adultos

ERA COVID-19



Soporte Vital Básico y DEA

Guías 2015

¿No responde y no respira con normalidad?

Llame a Emergencias
Teléfono 112

30 compresiones torácicas

2 respiraciones de rescate

Continuar RCP 30:2

En cuanto llegue el DEA
enciéndalo y siga sus
instrucciones

Soporte Vital Básico y DEA

ERA COVID-19

No responde y no respira con normalidad

Compruebe la respiración visualmente

No abra la vía aérea ni se aproxime a la nariz y boca de la víctima



Llame a Emergencias

Teléfono 112



Cubra la boca y nariz de la víctima con una mascarilla quirúrgica o pañuelo. Si fuera posible, el rescatador debería usar mascarilla



Proporcione compresiones torácicas continuas



Tan pronto como llegue el desfibrilador, conéctelo y siga instrucciones

Finalizada la RCP, el rescatador debería realizar con prontitud:
1-Lavado de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.
2-Comunicar con centro sanitario informando de su posible contacto con caso Covid-19

RCP Básica y COVID-19

Modificaciones Era Covid-19

NO APERTURA DE LA VÍA AÉREA



NO ACERCARSE A COMPROBAR SI RESPIRA



VENTILACIÓN, EN PRINCIPIO SOLO A BEBÉS Y NIÑOS PERO CON MÁS PROTECCIÓN



RCP – Cuándo Parar

--Decisión del Equipo Médico

..20 minutos sin respuesta?

..En algunas situaciones, valorar Prolongar

--Reanimador Exhausto


Obstrucción ADULTOS

OVACE

Obstrucción NIÑOS



OBSTRUCCIÓN de la VÍA AÉREA



Desobstrucción Cuerpo Extraño Bebé y Niño



Muchas Gracias, hasta la próxima.